



Ospedale Maria Vittoria – PRONTO SOCCORSO

## SCHEDA DI TRIAGE

PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI PATOLOGIE TRASMISSIBILI PER VIA AEREA

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Data nascita \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ ora \_\_\_\_\_  
Luogo \_\_\_\_\_

### RISCHIO TB

#### Segni e sintomi

- Tosse da più di due settimane  Emoftoe  Febbre o febbrecola  Dimagrimento

#### Fattori di rischio

- HIV  TD  Alcoolista  Pregressa TB  Immigrato  Senza fissa dimora  Carcerato  
 Patologie associate (diabete, immunocompromissione, cirrosi scompensata)  Precedente ricovero in reparto lungodegenti

#### Accertamenti radiologici

- Esito RX Torace per TB:  POSITIVO  SOSPETTO  NEGATIVO

#### Valutazione

- l'utente riferisce **oltre la tosse** almeno uno dei segni/sintomi indicati e/o la radiografia del torace risulta positiva o sospetta per TB → <sup>3</sup>ADOTTARE MISURE DI ISOLAMENTO PER PATOLOGIE TRASMISSIBILI PER VIA AEREA

### RISCHIO SARS

#### Segni e sintomi

- Febbre elevata > 38°C  Tosse  Respiro breve e affannoso

#### Fattori di rischio

- Provenienza, **nei 10 giorni antecedenti la comparsa dei sintomi**, da aree quali Cina, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Singapore, Canada (zona di Toronto), Filippine (zona di Manila)<sup>1</sup>  
 Contatto stretto<sup>2</sup>, **nei 10 giorni antecedenti la comparsa dei sintomi**, con persone malate provenienti recentemente da aree quali Cina, Taiwan, Vietnam, Hong Kong, Singapore, Canada (zona di Toronto), Filippine (zona di Manila)<sup>1</sup>  
 Personale sanitario con recente storia di assistenza diretta a pazienti affetti da polmonite

#### Accertamenti radiologici

- Esito RX Torace per SARS:  SOSPETTO  NEGATIVO

#### Valutazione

- l'utente riferisce presenza **contemporanea** di almeno 1 dei criteri epidemiologici e almeno 1 dei segni/sintomi indicati → <sup>4</sup>ADOTTARE MISURE DI ISOLAMENTO PER PATOLOGIE TRASMISSIBILI PER VIA AEREA E DA CONTATTO

Firma dell'infermiere \_\_\_\_\_

## **LEGENDA**

**TB** : tubercolosi

**TD**: tossicodipendente

## **NOTE**

<sup>1</sup> i criteri epidemiologici non sono più considerati nella definizione di caso dei CDC. A scopo preventivo, per il triage del paziente a rischio, vengono prese in considerazione le aree ad alto rischio di recrudescenza dell'infezione e le aree in cui si sono verificati dei casi secondari

<sup>2</sup> **CONTATTO STRETTO**: colui che si è preso cura, ha vissuto o ha avuto probabilità di contatto diretto con secrezioni respiratorie e/o fluidi corporei di definito caso di SARS. Esempi di contatto: baciare, abbracciare, condividere stoviglie, conversazione a distanza , conversazione a distanza ravvicinata ( 75 – 100 cm), visita medica. Contatto stretto **NON** comprende camminare vicino ad una persona sospetta, sostare per breve tempo in una ufficio o in una sala di attesa insieme a persone contagiate

### <sup>3 e 4</sup> **MISURE DI ISOLAMENTO**

#### **PRECAUZIONI IMMEDIATE**

1. L'operatore deve indossare immediatamente il filtrante **FFP2S**
2. Fare indossare al paziente una **mascherina chirurgica**
3. Condurre il paziente nella **stanza di isolamento** (se occupata, allontanare il paziente dal resto dell'utenza per il tempo necessario per allestire la camera)
4. Avvisare il **medico**

#### **ASSISTENZA PRESSO LA CAMERA DI ISOLAMENTO**

<sup>3</sup>**TB** = **ADOTTARE MISURE DI ISOLAMENTO PER PATOLOGIE TRASMISSIBILI PER VIA AEREA** (Consultare protocollo aziendale "Misure di isolamento in ospedale")

<sup>4</sup>**SARS** = **ADOTTARE MISURE DI ISOLAMENTO PER PATOLOGIE TRASMISSIBILI PER VIA AEREA E DA CONTATTO** (Consultare protocollo "gestione paziente SARS")