



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale 3

Cso. Svizzera, 164 – 10149 TORINO – Telef. 011/4393111
Codice Fiscale 03127980013

U.O.A. PREVENZIONE RISCHIO INFETTIVO A.S.L. 3

**PROTOCOLLI DI ANTIBIOTICO-PROFILASSI
IN OSTETRICIA-GINECOLOGIA**

**Gruppo di lavoro: Dott. Giusti U.O.a Ostetricia-Ginecologia
Dott.ssa. Mazengo U.O.a Farmacia
Dott. Macor – Dott. Bonasso Gruppo Operativo P.R.I.**

Gennaio 2002

PROFILASSI ANTIBIOTICA NEL RASCHIAMENTO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO

PATOGENI POSSIBILI: *Streptococchi gr. B, Enterococchi, Enterobatteri, S. Aureus, Anaerobi*

PROFILASSI CONSIGLIATA:

Prima scelta

PENICILLINA G 2 MU i.m. prima dell'intervento e 3 ore dopo
(nel I trimestre, con anamnesi positiva per P.I.D.)

CEFAZOLINA 2gr e.v. prima dell'intervento, da ripetere 6 e 12 ore
dopo
(solo nel II trimestre)

Seconda scelta

**METRONIDAZOLO 500 mg P.O. prima dell'intervento e dopo 4 e 8
ore, se allergia ai beta-lattamici**

PROFILASSI CONCORDATA

**AMPICILLINA + SULBACTAM 3 gr. e.v. PRIMA E 12 ORE DOPO
L'INTERVENTO**

COMMENTI